
cul.offpre.rmutp.ac.th/rspg/?p=3136
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกรรมเพียขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ
Search
หน้าแรก
ฐานข้อมูลพรรณพฤกษา มทร.พระนคร
Posted on February 6, 2020 by takky
Posted in ฐานข้อมูล


cul.offpre.rmutp.ac.th/rspg/?page_id=1383
ฐานข้อมูลพรรณพฤกษา มทร.พระนคร
กระถินณรงค์
กระดังงา
กล้วย
จำปี
ชงโค
ดอกแก้ว
ดอกราชาวดี
โพธิ์ร้อยในแหลม
บัวลดองชรัญ
เฟื่องฟ้า
มะทอก
มะนาว
ราชพฤกษ์
สีลาวดี
หมากนวล
อินทนิล

cul.offpre.rmutp.ac.th/rspg/?page_id=3166

กระถินณรงค์

Meta

Log in

Entries feed

Comments feed

WordPress.org

Show 10 entries Search:

ชื่อ Name/ชื่อพ้อง	Acacia auriculiformis Cunn.
ชื่อวงศ์	LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ชื่อท้องถิ่น	Matta
ลักษณะ	ไม้พื้นเมืองภาคกลาง เป็นของแปลกถิ่น ลายเมือง เป็นแผ่นก็ทำนองแบบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เมื่อยังเป็นต้นอ่อน และกิ่งใบเป็นปีกคู่ขึ้นเพียงเพื่อการใบแต่ต้นอ่อนภาคเป็นแผ่นต่อกัน เป็นเส้นยื่นออกทางกับเป็นระยะๆ ก้านต่อกันปรุงของขนาน ลายเป็นเหลี่ยมที่ 2 ด้าน ให้เป็นรูปเคียว ช่อดอกแบบช่อแบบหนาแน่นออกเป็นคู่ ตามกิ่งใบและปลายกิ่ง ช่อดอกมีกลีบดอกสีเหลือง กลิ่นหอม ฝักแบน มีน้ำมันเป็นขนาด 1-3 ซม เป็นแผ่นตรงยาวที่ 2 ด้าน มี 5-12 เมล็ด เมล็ดมีน้ำตาลดำเป็นมัน
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับและปลูกเป็นสวนป่า
ลักษณะทางนิเวศวิทยา	
1. การ และสำคัญการเป็นเมล็ด	เป็นไม้ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรงเรียว เปลือกเรียบ แต่ถ้าเก่าขึ้นจะเป็นร่องลึก ลำต้นกลมไม่ตรงนัก เปลือกของต้นอ่อนมีสีเทา ผิวขรุขระ เปลือกบริเวณที่ลำต้นที่ทำลายเป็นสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบและตกสะเก็ด และก็ทำนาน และหนาแน่นมากขึ้นระยะเป็นแผล ตามาแผลก็เกิดในเส้นต้นสวยและสำคัญ ก็ส่งผลมีสีเทา ก็มีสีน้ำตาลเข้มไม่ทะเป็นเมล็ด เปลือกหนาประมาณ 3-5 มิ ระยิ่งเพิ่มเมื่อเป็นสีน้ำตาล และเป็นสีตลอดไปก็ยังเป็น เปลือกมาประมาณ 5-10 มิ ระยิ่งเป็นเพิ่มเมื่อเป็นสีน้ำตาล และเป็นสีตลอดไปก็ยังเป็น เปลือกมาประมาณ 10 มิ ระยิ่งมีน้ำตาลเข้มเป็นสีน้ำตาลอ่อน เป็นตามต้นไม้ยังเพิ่มขึ้น และการมีอายุมากขึ้นมีน้ำตาลอ่อน และมีลายตามขวาง
2. ใบ	การเป็นแบบเป็นพิเศษไม่เหมือน และใบไม่ต่อออกที่มี ต้นประแสงใน 1-2 คู่ เป็นใบแผ่นขนาดเล็ก เมื่อใกล้เป็นแผ่นขนาดแผ่นก็ต่อเป็นใบเดี่ยวๆ และการตามก็เป็นแผ่นเป็นใบมีลักษณะเป็นขนาด และใบเป็นรูปเคียว มีสีเขียวอ่อน ลักษณะต่างหาก ในการประมาณ 1.2-2.5 ซม. ความยาวประมาณ 10-16 ซม. และเป็นเป็นเส้นใน 3 เส้น ขนานกันตามแนวการการใหญ่ในการของลายใบ
3. ดอก	การเป็นแบบช่อดอกเป็นพิเศษ ตามยอดใบ ดอกช่อดอกตามต่อกระบวนการ มีสีเหลือง ส่งกลิ่นหอม และช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก 70-100 ดอก มีขนาดเล็กประมาณ 1 มิลลิเมตร ดอกออกปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกในช่วงเดือนประมาณ-กรกฎาคม ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ของปีนี้ ใช้ในการออกดอกเดือนประมาณ เมื่อวันที่ 15 ดอกที่ผลบานทดเป็นปีก ส่วนดอกที่ไม่ได้ผลบาน ใดในเดือนช่อดอกเป็นดอกที่ผลติดดอกเป็นปีกประมาณ 2-3 มิ
4. ผล	ผลมีลักษณะเป็นฝัก ฝักเกลี่ยยาวฝัก มีสีประมาณมีสีเขียว มีความมีสีน้ำตาลอ่อน และฝักมีความยาวเป็น เป็นประมาณ ฝักยาวเป็นเป็นประมาณ 1 มิ ฝักมีความยาวเป็นเป็นประมาณ และมีเป็น